




ब्रोइलर कुखुराको साप्ताहिक व्यवस्थापन



चल्ला ल्याउनु भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कार्यहरू



क्रियाकलाप	छ	छैन
चल्ला ल्याउनु भन्दा १ हप्ता अगाडि खोरमा आवश्यक सामग्री सहितको व्यवस्थापन गरिएको		
०.२ वर्ग फिट प्रति चल्ला स्थान निर्धारण गरिएको		
चिक गार्ड राखिएको		
भुइँमा भुस/सोत्तर बिछ्याइएको (पक्की भुइँमा २ इन्च, माटोको भुइँमा ४ इन्च)		
ग्याँस, विद्युतीय वा भुसको ब्रुडर तयारी गरी चल्ला आउनु २४ घण्टा अघिबाट न्यानो पारिएको		
खोरको तापक्रम करिब ३२ °C (९०°F) भएको र तापक्रम जाँचन थर्मोमिटर झुण्ड्याइएको		
भुस माथि कागज बिछ्याइएको		

चल्ला आएको मिति:

जम्मा चल्ला संख्या:





ब्रोइलर कुखुराको साप्ताहिक व्यवस्थापन

पहिलो हप्ताको जाँचसूची



क्रियाकलाप	छ	छैन
चल्लाको तौल ३५-४० ग्राम		
चल्ला चारैतिर छरिएर बसेको		
बि ₀ दाना (१२-१८ ग्राम/२४ घण्टा/ चल्ला)		
१०० चल्ला बराबर एउटा नाङ्ग्लो राखिएको		
इलेक्ट्रोलाइट, मल्टिभिटामिन, प्रोबायोटिक्स दिएको		
२४ घण्टापछि गाँड जाँच्दा, ९५% चल्लाको गाँड भरिएको		
दोस्रो दिनबाट १ घण्टा बत्ती निभाइएको		
तीन दिन पछि भुसमाथिको कागज हटाइएको		
खोरको तापक्रम ८५-९०°F (२९-३२°C) भएको		
३ दिनपछि ०.२५ वर्ग फिट/चल्ला क्षेत्रफल उपलब्ध		
पाँचौं/छैठौं दिनबाट ८ घण्टा बत्ती निभाइएको		
५-७ दिनभित्र रानीखेत विरुद्ध खोप दिइएको		
७ दिनमा चल्लाको तौल १८०-२०० ग्राम पुगेको		

जानी राखौं:

- औषधि पानी बनाउँदा ८ घण्टाभित्र खाइसक्ने पानीमा बनाउनु पर्छ
- खोप प्रयोग गर्नु २४ घण्टा अघि र पछि साबुन, सर्फ, एन्टिवायोटिक, निःसंक्रमण औषधि आदि प्रयोग गर्नु हुँदैन
- जैविक सुरक्षाका उपायहरु लागु गर्नुपर्छ
- फार्मको रेकर्ड अद्यावधिक गर्नुपर्छ





ब्रोइलर कुखुराको साप्ताहिक व्यवस्थापन

दोस्रो हप्ताको जाँचसूची



क्रियाकलाप	छ	छैन
७ दिनपछि ०.३५ वर्ग फिट/चल्ला क्षेत्रफल उपलब्ध गराइएको		
तापक्रम ८०-८५°F (२७-३०°C) भएको		
राति ८ घण्टा बत्ती निभाएको		
* ९-१० दिनमा लिचि रोग विरूद्धको खोप दिएको		
१२ दिनपछि ०.५ वर्ग फिट/चल्ला क्षेत्रफल उपलब्ध गराइएको		
१२-१४ दिनमा गम्बारो रोग विरूद्धको खोप दिएको		
१४ औं दिनमा करिब ७० ग्राम प्रति चल्लाको दरले दाना खाएको		
१४ औं दिनमा ४८५-५३० ग्राम प्रति चल्ला तौल पुगेको		

* लिचि हार्ट र इन्फेक्सियस ब्रोन्काइटिस (IB) रोगको प्रकोप बढि भएको क्षेत्रहरुमा खोपको तालिकामा समावेश गर्ने ।

जानी राखौं:

राति बत्ती निभाउँदाका फाइदाहरू

- यसले कुखुराको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ
- मृत्युदर कम गराउनुका साथै FCR (Feed Conversion Ratio) मा सुधार गर्छ

तर ख्याल गरौं, बिरामी भई वा अन्य कारणले दाना खपत कम गरेको बेलामा बत्ती बाल्ने समय बढाउनु पर्दछ





ब्रोइलर कुखुराको साप्ताहिक व्यवस्थापन



तेस्रो हप्ताको जाँचसूची

क्रियाकलाप	छ	छैन
१५ औं दिनबाट बि ₁ र बि ₀ दाना मिसाएर दिएको		
१४-२१ दिनसम्म खोरको तापक्रम ७५-८०°F (२४-२६°C) भएको		
राति ८ घण्टा बत्ती निभाएको		
१९-२१ दिनमा गम्बारो (IBD Intermediate) विरूद्ध खोप दिएको		
२१ औं दिनमा १०५-१२५ ग्राम दाना खाएको		
२१ दिनको चल्लाको तौल १०००-११०० ग्राम भएको		

जानी राखौं:

भेन्टिलेसनका मुख्य फाइदाहरू

- खोरभित्र आर्द्रता कायम हुने
- खोरभित्र अक्सिजन कायम हुने
- सोत्तर सुख्खा रहने





ब्रोइलर कुखुराको साप्ताहिक व्यवस्थापन



चौथो र पाँचौं हप्ताको जाँचसूची

क्रियाकलाप	छ	छैन
२२ औं दिनबाट पूरा ठाउँ दिएको (१ वर्ग फुट प्रति कुखुरा)		
तापक्रम ७०-७५°F (२१-२४°C) कायम राखेको		
राति ७ घण्टा बत्ती निभाएको		
२४-२६ दिनमा रानीखेत रोग विरूद्धको (ND Lasota) खोप दिएको		
२८ औं दिनमा १४५-१६५ ग्राम दाना खपत भएको		
२८ औं दिनको चल्लाको तौल १६००-१७८५ ग्राम भएको		
२८ औं दिनबाट प्रति खण्ड १००० कुखुरा मात्र राखेको		
२९ औं दिनबाट राति ६ घण्टा बत्ती निभाएको		
२९ औं दिनबाट बि _१ दाना क्रमशः बि _२ सँग मिसाएको		
३५ औं दिनमा १७०-१९० ग्राम दाना खाएको		
३५ दिनको चल्लाको औसत तौल २२००-२४०० ग्राम		





ब्रोइलर कुखुराको साप्ताहिक व्यवस्थापन



छैठौं हप्ता र सातौं हप्ताको जाँचसूची

क्रियाकलाप	छ	छैन
३६ औं दिनबाट राति ५ घण्टा बत्ती निभाएको		
४२ औं दिनमा २००-२१० ग्राम दाना खपत भएको		
४२ औं दिनको चल्लाको तौल २८००-२९०० ग्राम भएको		
४२ औं दिनबाट राति ४ घण्टा बत्ती निभाएको		
४९ औं दिनमा २२०-२४० ग्राम दाना खपत भएको		
४९ औं दिनको चल्लाको तौल ३४००-३४५० ग्राम भएको		

अन्त्यमा

- सबै कुखुराहरू बिक्री भएपछि खोर पूर्ण रूपमा खाली गर्ने
- खोर खाली भए पश्चात बाँकी सुली खुर्केर फाल्ने र खोर तथा उपकरण सफा गर्ने
- निःसंक्रामक औषधि प्रयोग गरी सम्पूर्ण खोर निःसंक्रमण गर्ने
- मुसा, किराहरू नियन्त्रण गर्ने विधि/ औषधि प्रयोग गर्ने
- खोरलाई कम्तीमा १५ दिन खाली राखी राम्रोसँग सुकाउने, निःसंक्रमण गर्ने

